

IMIDASECT BARATAS

ARMADILHAS

Isco em gel (GL) em placas de isco contendo 2,15% (p/p) de imidaclopride
 Autorização de venda PT/DGS ARMPB-30/2017 concedida pela DGS

INSECTICIDA DE USO DOMÉSTICO EM PLACAS DE ISCO

CARACTERÍSTICAS

IMIDASECT BARATAS em placas de isco é um insecticida destinado ao público em geral, indicado para o controlo de baratas em:

- Locais interiores, como casas, apartamentos, edifícios públicos, cinemas, igrejas, hotéis, restaurantes, infantários, escolas, hospitais, casas de repouso, balneários públicos, meios de transporte (navios, comboios, aviões), armazéns, etc.
- Uso exterior, como uma barreira em redor de edifícios, em potenciais pontos de entrada para baratas (janelas, portas, aberturas de ventilação, etc.).

IMIDASECT BARATAS em placas de isco contém no seu interior um isco em gel com imidaclopride, que actua por ligação aos neurónios causando distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos dos insectos, o que se torna letal. Em condições normais, o gel presente nas placas de isco mantém-se activo e palatável pelo menos durante dois meses.

As baratas são atraídas pelos nutrientes do gel/isco. Estas espalham o gel durante o movimento, contaminando deste modo seus pares, causando envenenamento por contacto e ingestão.

IMIDASECT BARATAS está recomendado no combate à barata alemã (*Blatella germanica*) e barata oriental (*Blatta orientalis*).

MODO DE EMPREGO

Antes do tratamento, remova o máximo possível de todas as fontes atractivas de alimentos para as baratas (restos de comida, migalhas, etc.) da área infestada, de modo a estimular a ingestão do gel.

Aplique as placas de isco nas áreas infestadas e nos caminhos de acesso, mas também entre fontes de alimentos, bem como zonas abrigadas quentes (<50 °C) e húmidas (cantos, fendas, condutas de ventilação, atrás de rodapés e electrodomésticos, ao longo de tubos, perto de pontos de água, etc.).

No caso de uso no exterior, aplique as placas de isco somente em superfícies pavimentadas, como terraços ou pátios.

Durante as inspecções, verificar a área tratada e, se necessário, substituir as placas de isco, pois as baratas deixam excrementos e secreções para atrair as suas congéneres.

Substituir também as placas de isco que apresentem o gel ressequido, a fim de manter a palatabilidade do produto.

DOSES DE APLICAÇÃO

Organismos-alvo	Nível de infestação	Dose de aplicação	N.º de aplicações
Insectos adultos e ninfas da barata alemã (<i>Blatella germanica</i>)	Normal	1 placa de isco / 14 m ²	As aplicações podem ser repetidas a cada 2 meses ou quando o produto é consumido.
	Alto	1 placa de isco / 7 m ²	
Insectos adultos e ninfas da barata oriental (<i>Blatta orientalis</i>)	Normal	1 placa de isco / 7 m ²	Máximo de 6 aplicações/ano.
	Alto	1 placa de isco / 5 m ²	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Não expor as placas de isco à luz solar e manter afastado de fontes de calor, como aquecedores/radiadores.

Informar o seu distribuidor se o tratamento não for eficaz.

A validade do produto é de dois anos após fabrico.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO

Evitar contacto desnecessário com a preparação. O manuseamento pode ser prejudicial á saúde.

Não contaminar alimentos, utensílios de cozinha ou superfícies de contacto com alimentos.

Os iscos devem ser colocados de modo a minimizar o risco de serem consumidos por outros animais ou crianças.

Não forçar a abertura da placa de isco.

Aplicar o produto apenas em locais protegidos da chuva de modo a não haver arrastamento.

Não usar o produto se houver risco de escoamento para fossas ou sistemas de drenagem.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA



ATENÇÃO

H410 Muito Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH208 Contém 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Pode provocar reacção alérgica.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

P201 Manter fora do alcance das crianças

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contacto com a pele, lavar com água abundantemente.

Se houver irritação da pele ou erupção: recorrer ao aconselhamento/cuidado médico. Tratamento sintomático.

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Tel.: 808250143

EMBALAGENS

Embalagem contendo 2 placas de isco com 1,4 g de gel.

IMIDASECT BARATAS é um produto de Sharda Europe B.V.B.A. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.

Use biocidas com precaução. Antes de usar leia o rótulo.

Respeitar os usos, doses, condições e precauções indicados no rótulo, cuja determinação se baseou nas características do produto e nas condições de aplicação para qual é recomendado.

O tratamento deve ser efectuado de acordo com as boas práticas tendo em conta que é da responsabilidade do aplicador todos os factores que podem ser envolvidos e estão fora do nosso controlo (materiais usados, condições de aplicação, misturas, etc.).

O fabricante garante apenas a qualidade do produto vendido na embalagem original.