

IMIDASECT Baratas

Produto biocida (TP 18) – Inseticida

Público em geral

Gel para aplicação direta (GD) contendo 2,194% (p/p) de imidaclopride

Autorização nº PT/DGS ARMPB-37/2021 concedida pela DGS



MODO DE AÇÃO

A substância ativa imidaclopride atua por ligação aos neurónios dos insetos. Esta ligação causa distúrbios na transmissão dos impulsos nervosos, o que se torna letal para o insetos-alvo.

As baratas são atraídas pelos nutrientes do gel/isco. Estas espalham o gel durante o movimento, contaminando deste modo seus pares, causando envenenamento por contato e ingestão.

Em condições normais, as gotas de gel mantêm-se ativas e palatáveis pelo menos durante 3 meses, pelo que o produto pode ser usado continuamente por 3 meses sem substituir o isco não consumido.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

IMIDASECT Baratas destina-se ao USO INTERIOR e é aplicado em fendas e fissuras.

Está indicado no combate a baratas em locais como casas, caves de apartamentos, edifícios públicos, cinemas, igrejas, hotéis, restaurantes, infantários, escolas, hospitais, casas de repouso, balneários públicos, meios de transporte (navios, comboios, aviões), áreas de armazenamento e armazéns industriais.

Antes do tratamento, retire todas as fontes naturais de alimento para baratas (desperdícios, restos de comida, etc.) da área infestada para estimular a ingestão do gel.

O produto deve ser aplicado apenas em áreas restritas, em superfícies não limpas regularmente, por ex. atrás ou por debaixo do frigorífico, por debaixo do lava-loiças ou da pia da cozinha, por debaixo do fogão ou do esquentador de água quente, em todas as fendas e fissuras que possam ser um abrigo para baratas.

Durante as inspeções, verifique a área tratada e, se necessário, substitua o gel usado, pois as baratas deixam secreções e excrementos para atrair as outras baratas da mesma espécie.

Para proteger aves, animais de estimação e mamíferos, as baratas mortas devem ser retiradas diariamente da área tratada.

Não expor as gotas do gel de isco à luz solar ou a fontes de calor (ex. um aquecedor). Não aplicar em superfícies porosas. No caso de não ser possível aplicar as gotas do gel de isco diretamente na superfície a tratar, aplicar o produto numa folha ou num filme de plástico.

Informe o Titular da Autorização se o tratamento for ineficaz.

DOSES DE APLICAÇÃO

Se um grande número de baratas for visível ou houver suspeita disso, aplique a dose indicada para "Infestação alta". Se apenas uma ou algumas baratas tiverem sido observadas, aplique a dose de indicada para "Infestação fraca".

Espécie-alvo	Infestação fraca	Infestação alta
Barata alemã (ninfas e adultos)	2 gota / m ²	3 gotas / m ²
Barata oriental (ninfas e adultos)	2 gotas / m ²	3 gotas / m ²

Nota: 1 gota de gel com aproximadamente 5 mm de diâmetro equivale a 0,1 g

As aplicações podem ser repetidas a cada 2 meses ou quando o produto é consumido (máx. 6 aplicações/ano).

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DO RISCO

Colocar o gel de isco fora do alcance das crianças, aves, animais de estimação, animais de criação (gado) e outros animais não visados.

Evitar a libertação para o ambiente.

Não usar diretamente sobre ou próximo de comida, alimentos ou bebidas, superfícies ou utensílios que possam vir a estar em contacto com comida, alimentos, bebidas e rações para animais.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Manter fora do alcance das crianças.

Manter afastado de alimentos, bebidas e de alimentos e rações para animais.

O produto deve ser armazenado afastado da luz.

A validade do produto é de 2 anos após fabrico.

ELIMINAÇÃO

O produto não utilizado não deverá ser eliminado em solos, em cursos de água, em canalizações (pias, lavatórios, etc.) nem em ralos escoamento.

Elimine o produto não utilizado, a sua embalagem e todos os outros resíduos de acordo com a legislação em vigor.



Este produto biocida contém imidaclopride, que é perigoso para as abelhas.

PRIMEIROS SOCORROS

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de voltar a usar. Lave a pele com água. Se ocorrer irritação cutânea ou erupção cutânea: consulte um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Se ocorrerem sintomas, lave com água. Remova as lentes de contacto, se presentes e se tal for possível. Contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do 800 250 250 ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Se ocorrerem sintomas, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do Tel. 800 250 250 ou um médico.

UFI: ECDV-Y6K8-490M-5V2U

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

ATENÇÃO

H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P201 Manter fora do alcance das crianças

P273 Evitar a libertação para o ambiente.

P391 Recolher o produto derramado.

P501 Eliminar conteúdo e a embalagem num local adequado à sua recolha, de acordo com a legislação nacional em vigor.

EMBALAGENS

Embalagem de 10 g.

IMIDASECT Baratas é um produto de Sharda Europe B.V.B.A. Distribuído por EPAGRO – Serviços Agrícolas, Lda.