

Rotulagem da embalagem primária garrafas de 250g, 500g, 600g,750g, 1kg, 1,5kg, 2kg e 3kg

MUSCID 100 SG

INSETICIDA. BIOCIDA DE USO VETERINÁRIO

Grânulos solúveis (SG) com 10% (p/p) de acetamiprida para o controlo de moscas

Conteúdo líquido: xxxg, xKg

Lote n.º:

Prazo de validade: 3 anos

Autorização de colocação no mercado n.º **330/00/18NBVPT** concedida pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR APLICADORES PROFISSIONAIS

PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Responsável pela ACM e Fabricante:

KWIZDA – France S.A.S.

30, Avenue de l'amiral Lemonnier

F-78160 Marly Le Roi - France

Tel : +33 (0)1 39 16 09 69

FAX :+33 (0)1 39 16 47 07

Composição

Acetamiprida	10% p/p
Atraente (cis-9-tricosene)	0,05% p/p
Outros coadjuvantes e aditivos.....	c.s.p 100% p/p

ÁREA DE APLICAÇÕES E USOS

Características

O MUSCID 100 SG é uma formulação à base da substância ativa acetamiprida, um inseticida de nova geração da família dos neonicotinoides. Atua por contacto e por ingestão sobre o sistema nervoso central das moscas. Devido à incorporação de um atraente sexual, o cis-9-tricosene, e a presença de atraentes alimentícios (sacarose e lactose), as moscas pousam para se alimentarem destes açúcares e morrem rapidamente.

Destina-se a ser aplicado em instalações pecuárias.

Modo de aplicação

O MUSCID 100 SG apresenta-se na forma de grânulos solúveis que podem ser aplicados de duas formas distintas, designadamente, por pulverização ou mediante a pintura das paredes e zonas a proteger.

O MUSCID 100 SG assegura uma proteção das zonas e áreas tratadas.

Dose de aplicação

Para a proteção de uma superfície de 100 m²:

Pintura: Misturar 250 g de MUSCID 100 SG em 200 ml de água. Aplicar a pasta que se forma com um pincel, trincha ou rolo sobre as superfícies onde normalmente posam as moscas e/ou sobrevoam (em torno dos caixilhos das janelas ou portas, muros, etc.) Pintar entre 25 e 35 pontos do produto a cada 20 cm, dependendo do tipo de superfícies e da configuração das áreas a tratar. O produto pode ser aplicado na presença de animais.

Pulverização: Diluir 250 g de MUSCID 100 SG em 2,5 L de água. Agitar o tanque do pulverizador. Aplicar sobre 33 m² de superfície onde as moscas posam e/ou sobrevoam (em torno dos caixilhos das janelas ou portas, muros, etc.).

Em ambos os casos, deve-se evitar-se que o produto alcance e esteja ao alcance dos animais.

Número de aplicações

MUSCID 100 SG apresenta uma persistência de ação de 3-4 semanas, em função do grau de infestação.

Precauções de utilização

Recomenda-se a utilização de luvas de proteção durante o seu manuseamento.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Não respirar os vapores.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

Telefone em caso de emergência CIAV – Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143

Recomendações para os casos de intoxicação ou acidente

A intoxicação pode provocar irritação gástrica, depressão do sistema nervoso central, hipotensão e arritmias.

Primeiros socorros:

Retire a pessoa da zona contaminada.

Remova a roupa manchada ou salpicada.

Lave os olhos abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos. Retirar eventuais lentes de contacto.

Lavar bem a pele com água e sabão, sem esfregar.

Não administrar nada por via oral.

Em caso de ingestão NÃO provocar o vômito.

Manter o paciente em repouso.

Conservar a temperatura corporal.

Controlar a respiração. Se necessário, proporcionar respiração artificial.

Caso a pessoa esteja inconsciente, deitá-la de lado com a cabeça mais baixa do que o resto do corpo, mantendo as pernas semi-dobradas.

Transportar o intoxicado para um centro hospitalar e, sempre que possível, levar a embalagem ou o rótulo.

Conselhos terapêuticos para médicos e pessoal sanitário:

Tratamento sintomático.

EM CASO NENHUM SE DEVE DEIXAR A PESSOA INTOXICADA SOZINHA

Armazenagem

O produto é estável à temperatura ambiente e sob condições normais de utilização. Durante a armazenagem, o produto deverá ser mantido na sua embalagem original que deverá estar hermeticamente fechada. Manter em lugar seco, fresco e ventilado.

As embalagens vazias deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados para a sua recolha, e de acordo com a legislação em vigor.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.