

BRODY DOMÉSTICO

Isco fresco pronto a usar

Tipo de princípio ativo: Anticoagulante de 2ª geração

Família: Cumarínicos

Tipo de produto: TP14 - Rodenticida

Categorias de utilizadores: Uso doméstico

Tipo de formulação: 10g de pasta azul em saquetas de papel de filtro



COMPOSIÇÃO

Brodifacume (nº CAS: 259-980-5): 0.0025%

ORGANISMOS ALVO

Ratos e Ratazanas adultos e juvenis (*Rattus norvegicus* e *Mus musculus*).

MÉTODOS DA APLICAÇÃO

O produto é colocado no mercado em saquetas em pasta, mas deve ser sempre aplicado em estações de isco devidamente rotuladas. Nas estações colocar (100g-200g para ratazanas e 20g-40g para ratos), em estações ratoeiras cobertas e invioláveis ou em pontos de isco cobertos a uma distância mínima de 5 metros.

CAMPOS DE UTILIZAÇÃO

Interior e envolvente de edifícios.

Ratos (interior e envolvente de edifícios): Estações de isco com 20-40g de produto por cada ponto.

Ratazanas (interior e envolvente de edifícios): Estações de isco com 100-200g de produto por cada ponto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Uso doméstico. Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e qualquer outra informação que acompanhe o produto ou tenha sido providenciada no ponto de venda e seguir as instruções apresentadas. Antes da utilização do produto, devem ser considerados métodos de controlo não químicos, por exemplo: ratoeiras. Recomenda-se o uso de luvas de proteção. Utilizar em estações de isco invioláveis e fixas ao pavimento ou outra estrutura. Recarregar as estações quando necessário. Não abrir as bolsas contendo o isco. As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a ativação do roedor foi observada (por exemplo, caminhos, locais de nidificação, buracos, tocas, etc.). Colocar as estações de isco fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação ou outros animais não-alvo do produto. Colocar as estações de isco afastado de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou superfícies que possa estar em contacto. Remover alimentos facilmente alcançáveis pelos roedores (por exemplo: grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população de roedores e dificulta o consumo dos iscos. Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas, após aplicação do produto.

As estações de isco devem ser verificadas, pelo menos a cada 2-3 dias (ratos) ou 5-7 dias (ratazanas) no início do tratamento e depois semanalmente, de forma a verificar se o isco é aceite, se o isco está intacto e para remover os corpos dos roedores. Não colocar as estações de isco perto de sistemas de drenagem de águas, onde possa entrar em contacto com água. Colocar as estações de isco em áreas não suscetíveis de inundação. Substituir os iscos que tenham sido danificados pela água ou contaminados com sujidade. Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO

Considerar medidas de controlo preventivo (tapar aberturas, remover alimentos e bebidas para o mais longe possível), melhorando a ingestão do produto e reduzir uma reinfestação. Não usar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenir o aparecimento de roedores ou detetar a atividade de roedores). O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis. Os utilizadores devem rotular devidamente as estações de isco com as seguintes informações: “não mover ou abrir”; “contém rodenticida”; “nome e autorização do produto”; “identificação da substância ativa” e “em caso de incidente, contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel. 800 250 250”. O produto não deve ser utilizado por mais de 35 dias sem ser realizada uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento. Em caso de suspeita de falta de eficácia do tratamento. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento, o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas. Procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento, o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas. Procurar e remover os roedores mortos durante tratamento, pelo menos quando as estações de isco são verificadas.

DETALHES SOBRE OS EFEITOS DIRETOS OU INDIRETOS PROVÁVEIS, INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem fazer-se evidentes num prazo de 72 horas. As manifestações podem incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, podem surgir hematomas ou sangramento nas fezes e na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada por um médico/veterinário.

Em caso de contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão. Em caso de contacto ocular, lavar os olhos com água ou com líquido dos olhos, mantendo as pálpebras abertas, durante pelo menos 10 minutos. Em caso de ingestão, enxaguar a boca com água cuidadosamente. Não administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito.

NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O RÓTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL: 800 250 250).

No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância ativa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.

Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal. Perigoso para a vida selvagem.

As estações de isco devem ser rotuladas com a seguinte informação: “Não mover ou abrir”; “Contém rodenticida”; “Nome do produto ou número de autorização”; “Substância (s) ativa (s)”; “Em caso de incidente contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 800 250 250”.

INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO

No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem em conformidade com a regulamentação em vigor. Eliminar as estações de isco, no fim do seu tempo de vida útil, como resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Armazenar o produto na sua embalagem original, fechada, em local fresco, seco e bem ventilado. Manter afastado da luz direta do sol. Armazenar em local afastado das crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais. O produto biocida é estável durante 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Devido ao seu modo de ação demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4-10 dias para serem eficazes após o consumo do isco. Os roedores podem ser portadores de doenças. Não mexer nos roedores mortos com as mãos, usar luvas de proteção ou outras ferramentas, se disponíveis. O produto contém um agente amargante e um corante.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

H373: Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

P102: Manter fora do alcance das crianças. P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P314: Em caso de indisposição, consulte um médico. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente, assim como os animais mortos, como um resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos.

EMBALAGEM

Embalagem disponível: 150g

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

UFI: K830-40HS-C00N-Y7YX

Nº Autorização por Reconhecimento Mútuo: PT/DGS bbb-129/2019

Identificação do titular de autorização e responsável pela autorização de venda:

IMPEX EUROPA, S.L.

Avda. de Pontevedra, nº 39

36600 VILLAGARCÍA DE AROSA (Pontevedra)

Tel.: +34 986 50 13 71 Fax: +34 986 50 69 16

e-mail: impexeuropa@impexeuropa.es

Ficha de Segurança: *disponível mediante pedido*