

VEBITOX GRANULADO GOLD

Isco rodenticida em cereal pronto a utilizar

USO NÃO PROFISSIONAL

Área de utilização:

Interior e exterior em redor de edifícios



Composição:

100 g de produto contém:

Bromadiolona (NºCAS 28772-56-7) g 0,0027
 Benzoato de denatonio (NºCAS 3734-33-6) g 0,001
 Substâncias atrativas e corantes q.b.a g 100



ATENÇÃO

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

H373 Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

P102 Manter fora do alcance das crianças.
 P103 Ler o rótulo antes da utilização.
 P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
 P273 Evitar a libertação para o ambiente.
 P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um médico.
 P501 Eliminar o conteúdo em conformidade com a legislação nacional.

PRODUTO BIOCIDA (PT14)

AUTORIZAÇÃO de Direção-Geral da Saúde:

PT/DGS ARMPB-115/2018

Detentor da Autorização de Venda e Fabricante

Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman 43, 35010, Borgoricco (PD), 0499337111, www.vebi.it

Conteúdo: embalagens no máximo com 150 g

* saquetas pré-doseadas, cada uma contendo 10-12,5-15-20 g de rodenticida em grãos.

Validade: 2 anos após a data de fabrico

Lote n./de:

INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO

Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas, que podem demorar a

manifestar-se, podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e presença de sangue nas fezes ou na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.

Em caso de:

Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.

Exposição ocular, lavar os olhos com água ou solução para lavar os olhos. Manter as pálpebras abertas durante, pelo menos, 10 minutos.

Exposição oral, lavar cuidadosamente a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar imediatamente aconselhamento médico e mostrar o recipiente ou o rótulo do produto. Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.

As estações de isco devem ser rotuladas com as informações seguintes: «não mover ou abrir»; «contém um rodenticida»; «nome do produto ou número de autorização»; «substância(s) ativa(s)» e «em caso de incidente, contactar o centro anti-venenos (CIAV) 808 250 143».

Perigoso para a fauna selvagem.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VEBITOX GRANULADO GOLD 20 é um isco rodenticida pronto para a utilizar à base de Bromadiolona, eficaz contra Rato e Ratazana. É particularmente atrativo para roedores acostumados a alimentarem-se de cereais, e foi concebido para otimizar a eficácia contra todas as espécies de roedores supracitadas, mesmo na presença de forte competição alimentar.

VEBITOX GRANULADO GOLD contém um agente amargante com o objetivo impedir a ingestão acidental por crianças.

VEBITOX GRANULADO GOLD pode ser usado em e ao redor de edifícios industriais (incluindo armazéns, depósitos e navios), edifícios urbanos, habitações, adegas, garagens, depósitos, jardins.

ORGANISMOS ALVO

Rato doméstico (*Mus musculus*), jovens e adultos,

Ratazana castanha (*Rattus norvegicus*), jovens e adultos,
Rato preto (*Rattus rattus*) jovens e adultos.

MODO DE APLICAÇÃO

VEBITOX GRANULADO GOLD é um isco rodenticida pronto para a utilizar em grãos. O isco rodenticida deve ser colocado dentro de estações de isco invioláveis, devidamente marcado, protegido dos agentes atmosféricos, da ingestão accidental por crianças e espécies não-alvo e evitar a sua dispersão no meio ambiente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICAS

Antes da utilização, ler e seguir as informações do produto, bem como quaisquer informações que o acompanhem ou sejam fornecidas no ponto de venda.

Antes da utilização de produtos rodenticidas, é necessário considerar a utilização de métodos de controle não químicos (por exemplo, ratoeiras).

Remover os alimentos que estejam ao alcance dos roedores (por exemplo, grãos soltos ou resíduos alimentares). Além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois isso pode perturbar a população de roedores e dificultar a aceitação do isco.

As estações de isco devem ser colocadas nas proximidades de locais onde foi observada atividade de roedores (por exemplo, rotas, locais de nidificação, viveiros, buracos, tocas, etc.).

Se possível, as estações de isco devem ser colocadas no chão ou em outras estruturas.

Colocar as estações de isco fora do alcance de crianças, aves, animais de companhia, animais de criação e outros animais não visados.

Colocar as estações de isco longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que tenham contato com os mesmos.

Não colocar as estações de isco perto de sistemas de drenagem de águas onde possam entrar em contato com água.

Durante a utilização do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e a pele exposta diretamente depois de utilizar o produto.

Remover o isco restante ou as estações de isco no final do período de tratamento.

Não abrir as saquetas com o isco.

MODOS DE USO E DOSES DE EMPREGO

Utilização no Interior de edifícios para o controlo do Rato doméstico (*Mus musculus*).

Use 50 g de VEBITOX GRANULADO GOLD por estação de isco. Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 metros. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 2 metros.

Proteger o isco das condições atmosféricas adversas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, para verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para remover corpos de roedores. Quando necessário remover o isco.

Substituir o isco das estações danificadas por água ou contaminadas por sujidades.

Seguir as instruções do código de boas práticas adequado.

Utilização no Interior em redor de edifícios para o controlo do Ratazana castanha (*Rattus norvegicus*) e Rato preto (*Rattus rattus*).

Use 150 g de VEBITOX GRANULADO GOLD por estação de isco.

Se forem necessárias várias estações de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 10 metros. Em caso de elevado nível de infestação, a distância entre as estações deve ser de 5 metros.

Proteger o isco das condições atmosféricas adversas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

As estações de isco devem ser visitadas, pelo menos, a cada 5 ou 7 dias no início do tratamento e posteriormente, pelo menos, uma vez por semana, para verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e para remover corpos de roedores. Quando necessário remover o isco.

Substituir o isco das estações danificadas por água ou contaminadas por sujidades.

Seguir as instruções do código de boas práticas adequado

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ESPECÍFICOS

Manter fora do alcance das crianças.

Não manuseie o produto até que todas as recomendações de segurança tenham sido lidas e compreendidas.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Considerar a aplicação de medidas preventivas de controle (na medida do possível, tapar buracos e remover alimentos e bebidas) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de novas invasões.

Não utilizar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes (por exemplo, para prevenção de infestação ou para detectar atividades de roedores).

Este produto deve eliminar os roedores no prazo de 35 dias. As informações do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto) devem recomendar claramente que, em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento (ou seja, quando atividades de roedores ainda são observadas), o utilizador deve solicitar informações ao fornecedor do produto ou contatar um serviço de controlo de pragas.

Procurar e remover roedores mortos durante o tratamento, pelo menos com a mesma frequência das inspeções das estações de isco.

Eliminar os roedores mortos em conformidade com as normas em vigor.

Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado.

Manter o recipiente fechado e longe da luz solar direta..

Armazenar longe do alcance de crianças, aves, animais domésticos e animais de criação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Devido ao seu modo de ação retardado, os rodenticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a fazer efeito após o consumo do isco.

Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos com as mãos desprotegidas, utilizar luvas ou utilizar ferramentas (por exemplo, pinças) ao eliminá-los.

Este produto contém um agente amargante e um corante.

SÍMBOLO PONTO VERDE