

TOPORAT DOMÉSTICO

Isco fresco pronto a usar

Tipo de princípio ativo: Anticoagulante de 2ª geração
Família: Cumarínicos
Tipo de produto: TP14 - Rodenticida
Categorias de utilizadores: Público em geral
Tipo de formulação: 10g de pata azul em saquetas de papel de filtro



COMPOSIÇÃO

Brodifacume (Nº CAS: 259-980-5): 0.0025%

ORGANISMOS ALVO

Ratos e Ratazanas adultos e juvenis (*Rattus norvegicus* e *Mus musculus*).

MÉTODOS DA APLICAÇÃO

O produto é colocado no mercado em saquetas em pasta, mas deve ser sempre aplicado em estações de isco devidamente rotuladas. Nas estações colocar (100g-200g para ratazanas e 20-40g para ratos), em estações ratoeiras cobertas e invioláveis ou em pontos de isco cobertos a uma distância mínima de 5 metros.

CAMPOS DE UTILIZAÇÃO

Interior e envolvente de edifícios.

Ratos (interior e envolvente de edifícios): Estações de isco com 20-40g de produto por cada ponto.

Ratazanas (interior e envolvente de edifícios): Estações de isco com 100-200g de produto por cada ponto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de usar o produto, ler atentamente o rótulo e qualquer outra informação que acompanhe o produto ou tenha sido providenciada no ponto de venda e seguir as instruções apresentadas. Antes da utilização do produto, devem ser considerados métodos de controlo não químicos, por exemplo: ratoeiras. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.

Utilizar em estações de isco invioláveis e fixas ao pavimento ou outra estrutura. Recarregar as estações quando necessário. Não abrir as bolsas contendo o isco. As estações de isco devem ser colocadas nas zonas próximas onde a atividade do roedor foi observada (por exemplo, caminhos, locais de nidificação, buracos, tocas, etc.). Colocar as estações de isco fora do alcance das crianças, pássaros, animais de estimação ou outros animais não-alvo do produto. Colocar as estações de isco afastadas de alimentos, bebidas, rações, assim como de utensílios ou superfícies que possa estar em contacto.

Remover alimentos facilmente alcançáveis pelos roedores (por exemplo: grãos ou resíduos de alimentos). Para além disso, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois perturba a população de roedores e dificulta o consumo dos iscos.

Durante o manuseamento do produto, não comer, beber ou fumar. Lavar as mãos e as áreas de pele expostas, após aplicação do produto. As estações de isco devem ser visitadas pelo menos a cada [2 a 3 dias para ratos] e [5 a 7 dias para ratazanas] no início do tratamento e depois semanalmente, de forma a verificar se o isco é aceite, se o isco está intacto e para remover os corpos dos roedores.

Não colocar estações de isco perto de sistemas de drenagem de águas, onde possa entrar em contacto com água. Colocar as estações de isco em áreas não suscetíveis de inundação. Substituir os iscos que tenham sido danificados pela água ou contaminados com sujidade. Remover o restante isco ou estações de isco no final do tratamento.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO

Considerar medidas de controlo preventivo (tapar aberturas, remover alimentos e bebidas para o mais longe possível), melhorando a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinfestação.

Não usar o produto como iscos permanentes (por exemplo, para prevenir o aparecimento de roedores ou detetar a atividade de roedores). O produto deve ser utilizado em estações de isco invioláveis. Os utilizadores devem rotular devidamente as estações de isco com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém rodenticida"; "nome e autorização do produto"; "identificação da substância ativa" e "em caso de incidente, contactar o Centro de Informação Antiveneno, Tel. 800 250 250".

O produto não deve ser utilizado por mais de 35 dias sem ser realizada uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento. Em caso de suspeita de falta de eficácia no final do tratamento, o utilizador deverá consultar o fornecedor do produto ou serviço de controlo de pragas. Procurar e remover os roedores mortos durante o tratamento, pelo menos quando as estações de isco são verificadas.

DETALHES SOBRE OS EFEITOS DIRETOS OU INDIRETOS PROVÁVEIS, INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

O produto contém uma substância anticoagulante. Se ingerido, os sintomas podem fazer-se evidentes num prazo de 72h. As manifestações clínicas podem incluir hemorragia nasal e das gengivas. Em situações mais graves, pode surgir sangramento nas fezes e na urina.

Antídoto: Vitamina K1 administrada pelo médico/veterinário.

Em caso de:

- Contacto com a pele, lavar a pele com água e de seguida com água e sabão;
- Contacto com os olhos, lavar os olhos com água, manter as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos. Não esquecer de retirar as lentes de contacto, se tal lhe for possível.
- Ingestão, lavar a boca com água abundante. Nunca dar nada na boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Se ingerido, procurar ajuda médica e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto e consulte o Centro de Informação Antivenenos (800 250 250). Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal.

NÃO DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

SE NECESSÁRIO ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA DISPONÍVEL O ROTULO OU A EMBALAGEM DO PRODUTO E CONSULTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (TEL.: 800 250 250).

Contactar um veterinário em caso de ingestão por um animal. Perigoso para a vida selvagem.

No contacto com o Centro de Informação Antivenenos, informar o nº de autorização do produto, o nome comercial do produto e a substância ativa. Se possível, providenciar uma cópia do rótulo ou da ficha de dados de segurança.

INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO

No final do tratamento, eliminar os iscos não consumidos e a embalagem em conformidade com a regulamentação em vigor. Eliminar as estações de isco, no m do seu tempo de vida útil, como resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor. Recomenda-se o uso de luvas de proteção.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto na sua embalagem original, fechada, em local fresco, seco e bem ventilado. Manter a embalagem fechada e afastada da luz direta do sol. Manter afastado das crianças, pássaros, animais domésticos e outros animais. O produto biocida é estável durante 24 meses.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Devido ao seu modo de ação demorado, os rodenticidas anticoagulantes levam 4-10 dias para serem eficazes após o consumo do isco. Os roedores podem ser portadores de doenças. Não mexer nos roedores mortos com as mãos, usar luvas de proteção ou outras ferramentas, se disponíveis. O produto contém um agente amargante e um corante.

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

H373: Pode afetar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.

RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

P102: Manter fora do alcance das crianças. P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P314: Em caso de indisposição, consulte um médico. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente, assim como os animais mortos, como um resíduo perigoso em conformidade com a regulamentação em vigor, por gestor autorizado de resíduos.

EMBALAGEM

Embalagem disponível: 150g



Imagem ilustrativa da embalagem

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

UFI: NH00-XOF2-J00T-SAAV

Nº Autorização por Reconhecimento Mútuo: PT/DGS bbp-128/2019**Identificação do titular de autorização e responsável pela autorização de venda:**

IMPEX EUROPA, S.L.

Avda. de Pontevedra, nº 39

36600 VILLAGARCÍA DE AROSA (Pontevedra)

Tel.: +34 986 50 13 71 Fax: +34 986 50 69 16

e-mail: impexeuropa@impexeuropa.es**Ficha de Segurança:** *disponível mediante pedido*